

СОГЛАСОВАНО  
Россельхознадзором  
16 марта 2016 г

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата СЕКС БАРЬЕР<sup>®</sup> капли для сук и кобелей  
для регуляции половой охоты у сук и кобелей

(организация-разработчик ООО «НПК «СКиФФ», 117246, г. Москва  
ул. Научный проезд, д. 20 стр.3)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование: СЕКС БАРЬЕР<sup>®</sup> капли для сук и кобелей  
(SEX BARRIER<sup>®</sup> guttae ex canis feminae et canis musculi).

Международное непатентованное наименование действующих веществ:  
мепрегенолацетат водорастворимый и этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

СЕКС БАРЬЕР<sup>®</sup> капли содержит в качестве действующих веществ  
мепрегенолацетат водорастворимый и этинилэстрадиол. Выпускают препарат  
в двух модификациях (дозировках): СЕКС БАРЬЕР<sup>®</sup> капли для сук, с  
содержанием в 1 мл мепрегенолацетата водорастворимого – 2,0 мг и  
этинилэстрадиола – 0,02 мг; СЕКС БАРЬЕР<sup>®</sup> капли для кобелей, с  
содержанием в 1 мл мепрегенолацетата водорастворимого – 6,0 мг и  
этинилэстрадиола – 0,30 мг; в качестве вспомогательного вещества препарат  
содержит: оливковое масло (или ПЭГ-400).

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой  
прозрачную жидкость светло-желтого, зеленовато-желтого или золотисто-  
желтого цвета в случае применения оливкового масла, в случае применения  
ПЭГ – бесцветную жидкость.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий  
хранения – 3 года со дня производства.

Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР<sup>®</sup> капли для сук и кобелей  
запрещается применять по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР<sup>®</sup> капли для сук и кобелей  
выпускают расфасованным по 2, 3 и 5 мл в полимерные или стеклянные  
флаконы с капельницей. Флакон плотно укупоривают навинчиваемой  
крышкой с контролем первого вскрытия, флакон упаковывают в блистер и  
поштучно упаковывают в картонные пачки с инструкцией по применению.

5. Хранить лекарственный препарат следует в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.

10. Входящие в состав лекарственного препарата гестаген (мепрегенолацетат) и эстроген (этинилэстрадиол), воздействуя на гипоталамо-гипофизарную систему животных, снижают секрецию из гипофиза гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ). Вследствие этого происходит угнетение фолликулогенеза в яичниках и прекращается овуляция фолликулов. Этинилэстрадиол в комплексе с мепрегеноацетатом усиливает контрацептивный эффект, изменяя биологические свойства влагалищной среды, повышает вязкость слизи шейки матки, что тормозит подвижность сперматозоидов, а изменения в эндометрии матки препятствуют имплантации оплодотворенной яйцеклетки. У кобелей резко снижается уровень тестостерона, а, следовательно, половая активность.

Действующие вещества лекарственного средства хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

## III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей применяют сукам для угнетения полового возбуждения: прерывания и задержки течки, предотвращения нежелательной беременности; кобелям – для угнетения полового возбуждения и связанного с этим нежелательного поведения.

12. Лекарственный препарат противопоказан собакам породы грейхаунд, беременным и кормящим сукам, животным, не достигшим половой зрелости, а также при новообразованиях молочной железы, половых органов, при сахарном диабете и мочекаменной болезни.

13. Препарат вводят перорально, нанося на язык, на небольшой кусочек корма или лакомства. Дозировка зависит от массы животного и цели применения (см. таблицу 1):

Таблица 1

Вид животного	Назначение препарата		Масса тела животного	Дозировка	Курс применения	Начало приема	Примечания
Суки	Угнетение полового возбуждения	Прерывание течки	До 5 кг	1 капля	2 раза в день с интервалом 12 часов в течение 5-7 дней	Не позднее 2-х дней с момента начала течки	1. Прекращение течки наступает после полного курса применения. 2. В отдельных случаях применение препарата продлевают до полного прекращения течки. 3. Прерывание течки рекомендуется проводить не более 1-го раза в год.
		5,1 – 10 кг	2-4 капли				
	10.1-30 кг	5-8 капель	За 7-14 дней до предполагаемой течки	1. Позволяет сдвинуть течку примерно на 20-40 дней. 2. Задержку течки рекомендуется проводить не более 2-х раз в год.			
Свыше 30 кг	9+1 капля на каждые последующие 5 кг массы тела	Двукратно с интервалом 24 часа			Более поздний срок дачи препарата значительно снижает эффект воздействия.		
	Предотвращение нежелательной беременности						
Кобели	Угнетение полового возбуждения и связанного с этим нежелательного поведения		До 5 кг	1 капля	2 раза в день с интервалом 12 часов в течение 5-7 дней	Не позднее 2-х дней с момента начала полового возбуждения	1. Неэффективно применение препарата, если с момента начала полового возбуждения прошло более 2-х дней. 2. Молодым кобелям в первый день курса назначают двойную разовую дозу одновременно. 3. Успокоение животного наступает после полного курса применения. 4. В отдельных случаях применение препарата продлевают до полного прекращения полового возбуждения. 5. Повторный курс проводится по необходимости.
5,1 – 10 кг	2-4 капли						
10.1-30 кг	5-8 капель						
Свыше 30 кг	9+1 капля на каждые последующие 5 кг массы тела						

Молодым самкам в первую течку применять не рекомендуется из-за трудности определения времени начала половой охоты.

Через 2-3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции организма.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не установлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей при первом применении или при отмене не установлено.

16. Применение лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей беременным самкам, в период лактации, а также у потомства до достижения ими половозрелого возраста запрещено.

17. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторного применения препарата, его следует применить как можно быстрее, в той же дозировке и по той же схеме.

При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

18. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

19. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует.

20. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей не предназначен для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При применении лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей. Пустую тару, из-под лекарственного препарата, запрещается применять для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса  
производственных площадок  
производителей лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения.

1. ООО «НВП «Астрафарм», 117246,  
г. Москва, Научный проезд, дом 20,  
стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий от  
потребителя.

ООО «НВП «Астрафарм» 117246,  
г. Москва, Научный проезд, дом 20,  
стр. 3

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата СЕКС БАРЬЕР® капли для сук и кобелей, утвержденная Россельхознадзором 18 января 2012 года.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-3.0-0069№ПВР-2-1.5/01394