

Утверждено Россельхознадзором
15 ноября 2011 г

ИНСТРУКЦИЯ
по применению «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для регуляции
половой охоты у кошек и сук

(организация-разработчик ООО «НПК «СКиФФ», г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для кошек и сук («Sex Barrier[®]» *tabulettae pro felis et canis feminae*). Международное непатентованное наименование: мепрегенолацетат водорастворимый и этинилэстрадиол.

2. «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для кошек и сук – гормональный контрацептивный лекарственный препарат для кошек и сук в форме таблеток для перорального применения.

Лекарственный препарат в качестве действующих веществ содержит в одной таблетке (100 мг) мепрегенолацетата водорастворимого 0,100 мг и этинилэстрадиола 0,001 мг; вспомогательные вещества: сахар молочный, крахмал картофельный, кальций стеариновокислый, краситель пищевой.

Выпускают «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для кошек и сук расфасованным в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой или в контурную безъячейковую упаковку из бумаги с полиэтиленовым покрытием, которые упаковывают в картонные коробки.

3. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года от даты производства. Датой производства считают дату расфасовки.

Секс Барьер[®] таблетки для кошек и сук запрещается применять по истечении срока годности.

4. «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для кошек и сук хранят с предосторожностью в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

5. «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для кошек и сук следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7 Фармакологическая группа: гормоны и их антагонисты.

«СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для кошек и сук - гормональный контрацептивный лекарственный препарат, предназначенный для регуляции половой охоты (задержки и прекращения течки) и предотвращения нежелательной беременности у кошек и сук.

Входящие в состав лекарственного препарата гестаген (мепрегенолацетат) и эстроген (этинилэстрадиол), воздействуя на гипоталамо-гипофизарную систему животных, снижают секрецию из гипофиза гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ). Вследствие этого происходит угнетение фолликулогенеза в яичниках и овуляция фолликулов не происходит.

Действующие вещества лекарственного средства хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

«СЕКС БАРЬЕР®» таблетки для кошек и сук по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на организм животных.

III. Порядок применения

8. Лекарственный препарат «СЕКС БАРЬЕР®» таблетки для кошек и сук применяют для регуляции половой охоты (задержки и прекращения течки) и предотвращения нежелательной беременности у кошек и сук.

9. Лекарственный препарат противопоказан животным, не достигшим половой зрелости, беременным и кормящим самкам, а также при новообразованиях молочной железы и половых органов, сахарном диабете, мочекаменной болезни, собакам породы грейхаунд и при индивидуальной непереносимости компонентов.

Не рекомендуется давать кошкам и сукам лекарственный препарат, предназначенный для котов и кобелей вследствие различного гормонального фона женских и мужских особей.

10. Лекарственный препарат вводят перорально с кормом или принудительно на корень языка. Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения (см. таблицу 1).

Таблица 1

Вид животного	Назначение ЛС		Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Начало приема
Кошки	Регуляция половой охоты	Прерывание течки	До 5 кг	1 таблетка	1 раз в день в течение 3-5 дней	Не позднее 2-х дней с момента начала течки
			5,1 - 10 кг	1-2 таблетки		
		Задержка течки, поддержание успокаивающего эффекта	Независимо от массы тела животного	1 таблетка	Регулярно 1 раз в 14 дней	В период покоя или через 10 дней после исчезновения признаков половой охоты
	Предотвращение нежелательной беременности после случайного спаривания		Независимо от массы тела животного	2 таблетки	однократно	Не позднее 24 часов после случайного спаривания
Суки	Регуляция половой охоты	Прерывание течки	до 5 кг	1 таблетка	1 раз в день в течение 3-5 дней	Не позднее 2-х дней с момента начала течки
			5,1-10 кг	1-2 таблетки		
			10,1-30 кг	2-4 таблетки		
		Задержка течки	свыше 30 кг	4+1 таблетка	1 раз в день в течение 5-7 дней	За 7-14 дней до предполагаемой течки
	Предотвращение нежелательной беременности после случайного спаривания			на каждые последующие 10 кг массы тела	1 раз в день в течение 2-х дней	Не позднее 24 часов после случайного спаривания

Через 2-3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции животных.

11. Симптомы передозировки не установлены.

12. Особенности действия при начале применения препарата и при его отмене не установлено.

13. Пропущенную дозу лекарственного препарата необходимо применить как можно скорее.

При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

14. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей Инструкцией побочных эффектов и осложнений, а также привыкания не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

15. Несовместимости с различными лекарственными препаратами не выявлено.

16. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При применении лекарственного препарата «СЕКС БАРЬЕР®» таблетки для кошек и сук следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время применения лекарственного препарата не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании применения следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

18. При случайном попадании лекарственного средства внутрь – обратиться к врачу. Специфический антидот отсутствует. Лечение – симптоматическое.

19. Использованные упаковки из-под лекарственного препарата запрещается применять для бытовых целей, их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО «НВП «Астрафарм»; 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20. Тел/факс: (495) 785-83-50.

Инструкция разработана ООО «НПК «СКИФФ», г. Москва.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 30 июня 2006 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения 77-3-20.11-0494 №ПВР-3-1.0/00311