



## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук

(Организация-разработчик ООО «НПК «СКиФФ» 117246, г. Москва  
Научный проезд дом 20, строение 3, этаж 2, помещение 204)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-2.17-3582№ПВР-3-1.0/00311

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук (SEX BARRIER tabulettae pro felis et canis feminae).

международное непатентованное наименование действующих веществ: мепрегенолацетат, этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: таблетки для перорального применения.

Бигормональный контрацептивный лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук в качестве действующих веществ в 1 таблетке массой 100 мг содержит: мепрегенолацетат водорастворимый – 0,100 мг, этинилэстрадиол – 0,001 мг.

В качестве вспомогательных веществ СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук содержит: лактозу, кальция стеарат, краситель пищевой.

3. По внешнему виду препарат представляет собой таблетки овальной формы, двухцветные: белого или белого с сероватым оттенком цвета с одной стороны и от светло-розового до темно-розового цвета с логотипом «СБ» с другой стороны.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства.

СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук запрещается применять по истечении срока годности.

4. СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук выпускают расфасованными по 10 таблеток в блистере. Блистер с лекарственным препаратом помещают в картонную пачку с инструкцией по применению.

5. Хранят СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

6. СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается по рецепту.

## II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.

10. Входящие в состав лекарственного препарата гестаген (мепрегнолацетат) и эстроген (этинилэстрадиол), воздействуя на гипоталамо-гипофизарную систему животных, снижают секрецию из гипофиза гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ). Вследствие этого происходит угнетение фолликулогенеза в яичниках и прекращается овуляция фолликулов.

Этинилэстрадиол в комплексе с мепрегнолацетатом усиливает контрацептивный эффект, изменяя биологические свойства влагалищной среды, повышает вязкость слизи шейки матки, что тормозит подвижность сперматозоидов, а изменения в эндометрии матки препятствуют имплантации оплодотворенной яйцеклетки.

Действующие вещества лекарственного препарата хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

## III. Порядок применения

11. Бигормональный контрацептивный лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук применяют кошкам и сукам для регуляции половой охоты (прерывания и задержки течки), предотвращения нежелательной беременности.

12. Препарат противопоказан сукам породы грейхаунд, беременным и кормящим самкам, животным, не достигшим половой зрелости, а также при новообразованиях молочной железы, заболеваниях половых органов, при сахарном диабете, мочекаменной болезни и при индивидуальной непереносимости компонентов.

Не рекомендуется давать кошкам и сукам лекарственный препарат, предназначенный для котов и кобелей вследствие различного гормонального фона женских и мужских особей.

13. При применении лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы руки вымыть теплой водой с мылом.

При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо смыть большим количеством проточной воды. Людям с

гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук.

В случае проявления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или упаковку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Применение лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук беременным самкам, в период лактации, а также у потомства до достижения ими половозрелого возраста запрещено.

15. СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук вводят перорально с кормом или принудительно на корень языка. Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения (см. таблицу 1).

Таблица 1

Вид животного	Назначение ЛП		Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Начало приема / примечания	
Кошки	Регуляция половой охоты	Прерывание течки	До 5 кг	1 таблетка	1 раз в день в течение 3-5 дней	1. Не позднее 2-х дней с момента начала течки. 2. Повторный курс проводят по необходимости.	
			5,1 - 10 кг	1-2 таблетки			
		Задержка течки, поддержание успокаивающего эффекта	Независимо от массы тела животного	1 таблетка	Регулярно 1 раз в 14 дней		1. В период покоя или через 10 дней после исчезновения признаков половой охоты. 2. Может проводиться регулярно без перерывов.
	Предотвращение нежелательной беременности после случайного спаривания		Независимо от массы тела животного	2 таблетки	Однократно		Не позднее 24 часов после случайного спаривания
Суки	Регуляция половой охоты	Прерывание течки	До 5 кг	1 таблетка	1 раз в день в течение 3-5 дней	1. Не позднее 2-х дней с момента начала течки. 2. Прерывание течки рекомендуется проводить не более 1-го раза в год. 3. Задержку течки рекомендуется проводить не более 2-х раз в год.	
			5,1-10 кг	1-2 таблетки			
		Задержка течки	10,1-30 кг	2-4 таблетки	1 раз в день в течение 5-7 дней		1. За 7-14 дней до предполагаемой течки. 2. Позволяет сдвинуть течку примерно на 20-40 дней.
			Свыше 30 кг	4+1 таблетка на каждые последующие 10 кг массы тела	1 раз в день в течение 2-х дней		3. Задержку течки рекомендуется проводить не более 2-х раз в год.
	Предотвращение нежелательной беременности после случайного спаривания					Не позднее 24 часов после случайного спаривания	

Молодым самкам в первую течку применять не рекомендуется из-за трудности определения времени начала половой охоты.

Через 2-3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции организма.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

17. Симптомы передозировки при применении СЕКС БАРЬЕР® таблеток для кошек и сук не установлены.

18. Информация об особенностях взаимодействия СЕКС БАРЬЕР® таблеток для кошек и сук с другими лекарственными препаратами отсутствует.

19. Особенности действия препарата при первом применении или при отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторного применения препарата, его следует применить как можно быстрее, в той же дозировке и по той же схеме.

При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

21. СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук не предназначены для применения продуктивным животным.

Наименование производственной производителя препарата для применения.	и адрес площадки лекарственного ветеринарного	ООО «НВП «Астрафарм», 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, строение 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование, уполномоченной владелец удостоверения препарата на потребителя.	адрес организации, держателем или регистрантом лекарственного претензий от	ООО «НВП «Астрафарм» 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, строение 3, этаж 3, помещение I, комната 35. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор ООО «НПК «СКИФФ»

Т. В. Берштайнис

